COPROB
AGRICOLTURA E SOSTENIBILITÀ
DAL 1962

beetnews

N. 4
2026

Notiziario di informazione per una bieticoltura sostenibile

Per le misure agroambientali attenersi ai DPI Regionali

Consigli pratici per il controllo delle malerbe

Gli elementi da considerare più attentamente sono:

- **riconoscere le principali malerbe presenti;**
- **trattare quando le infestanti sono allo stadio di cotiledoni** (momento di massima sensibilità) e ripetere il trattamento dopo 7-15 giorni in funzione dell'andamento climatico;
- **aumentare le dosi** dei prodotti sia di contatto (es. Magic Tandem) sia residuali (Goltix, Metafol, ecc.) **nei casi in cui si intervenga su infestanti più sviluppate;**
- **il volume di acqua consigliato è 200 l/ha;** è bene che l'acqua sia limpida per evitare effetti di inefficienza del diserbo.

Tabella 1. *Strategie più efficaci contro le principali infestanti dicotiledoni. Ripetere il trattamento dopo 7-15 giorni (**per chi aderisce alle misure agroambientali attenersi ai disciplinari**).*
É possibile optare, nelle dosi opportune, per prodotti alternativi con i medesimi principi attivi.
Si consiglia di intervenire con microdosi. Indicativamente, anche nelle condizioni peggiori (terreni torbosi senza pre-emergenza) non superare le 4 applicazioni.
PER DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO CONSULTARE QUANTO INDICATO IN ETICHETTA.

Prodotti - Dosi orientative (l o kg/ha)	Note	Infestanti bersaglio	Note intervento
MICRODOSE STRATEGIA STANDARD Magic Tandem 1-1,2** + Metamitron* (70%) 0,5-0,7 + olio 0,3	Miscela generica di base		
MICRODOSE STRATEGIA RINPODE BV Magic Tandem 1-1,2** + Metamitron* (70%) 0,5-0,7 + olio 0,3 + Rinpode BV 0,020-0,026	POSSIBILI 3 INTERVENTI COMPLESSIVI RINPODE BV: MAX 0,080 l/ha/anno	Abutilon, ammi majus **N.B. Rinpode: 1° intervento su Cotiledoni; 2° a 2 Foglie vere; 3° a 4 Foglie vere**	**RINPODE BV: UTILIZZABILE SOLO NELLE REGIONI DOVE AUTORIZZATO CON DEROGA**
MICRODOSE STRATEGIA 1 TANARIS BEET Magic Tandem 1-1,2** + Tanaris 0,3	POSSIBILI ALTRI 2 INTERVENTI COMPLESSIVI AUMENTANDO TANARIS A 0,6 l/ha (VEDI STRATEGIA 2)	Effetto residuale su graminacee e infestanti dicotiledoni **N.B. Tanaris: 1° intervento su Cotiledoni**	**TANARIS BEET: UTILIZZABILE SOLO NELLE REGIONI DOVE AUTORIZZATO CON DEROGA**
MICRODOSE STRATEGIA 2 TANARIS BEET Magic Tandem 1-1,2** + Tanaris 0,6 ***	POSSIBILI 2 INTERVENTI COMPLESSIVI	Effetto residuale su graminacee e infestanti dicotiledoni **N.B. Tanaris: 1° intervento a 2 Foglie vere; 2° intervento dopo 7 - 15 giorni**	**TANARIS BEET: UTILIZZABILE SOLO NELLE REGIONI DOVE AUTORIZZATO CON DEROGA**

* Es. Goltix, Metafol 700, Nymeo oppure Sugar 500 (rapportandolo alla corretta dose)

** É possibile effettuare miscele estemporanee a base di Fenmedifam + Etofumesate

*** Se in pre emergenza non è stato utilizzato Metamitron, in caso di elevata infestazione si può addizionare in post emergenza

COPROB AGRICOLTURA E SOSTENIBILITÀ DAL 1962

beetnews

N. 4
2026

Notiziario di informazione per una bieticoltura sostenibile

Per le misure agroambientali attenersi ai DPI Regionali

Il diserbo della bietola, più di quello delle altre colture, richiede un'elevata professionalità maturata in questi ultimi decenni. Nonostante la progressiva revoca di principi attivi, è ancora possibile raggiungere buoni risultati, purchè gli interventi vengano effettuati con tempestività in funzione delle reali infestazioni e condizioni pedo-climatiche.

1. • Regolatore pH, Liquido anti-schiuma
2. • Sacchetti Idrosolubili (WSB)
3. • Granuli Idrosolubili (WG)
4. • Granuli Idrodispersibili (WG)
5. • Polveri Bagnabili (WP/PB)
6. • Sospensioni Concentrate (SC/Flow)
7. • Sospensioni Emulsionate (SE)
8. • Microcapsule in sospensione (MCPS)
9. • Emulsioni acquose (EW)
10. • Liquidi emulsionabili (EC), coadiuvanti, bagnanti, olio b.

Tabella 2. *Ordine corretto di inserimento delle miscele nella botte.*

Note: *Partire con la botte piena al 50%. Assicurarsi che la miscela durante il processo sia in agitazione. Aggiungere il regolatore pH se necessario. Aggiungere acqua gradualmente in modo che la botte sia piena al termine del processo. Assicurarsi ad ogni fase che il prodotto sia completamente disperso prima dell'aggiunta successiva.*
Attenzione: la miscela con i fertilizzanti fogliari non è consigliabile

Come contenere correttamente la cuscuta in post-emergenza

• **Propizamide**, di cui è composto **Kerb FLO (400 g/l),** agisce contro la cuscuta per assorbimento radicale e traslocazione interna, per cui la sua azione **è favorita in terreno umido** o a seguito di piogge.

*Tabella 3. Dosi (l/ettaro) di **Kerb FLO** per il contenimento della cuscuta*

In alternativa sono utilizzabili anche altri **formulati liquidi**
(es. **Pirat, Refrain, ecc. da non usare in miscela come indicato in etichetta**).
N.B.: Per una maggiore efficacia si consiglia l'uso con un adeguato volume di acqua

STRATEGIA CONSIGLIATA IN POST EMERGENZA		NOTE GENERALI	MISCIBILITÀ
1° INTERVENTO (2-4 foglie)	2° INTERVENTO (6-8 foglie)	In caso di interventi frazionati non oltrepassare la dose complessiva di 2,5 l/ha. I cereali da granella e le graminacee foraggere sono sensibili se seminate in successione.	NO
0,7-1	1-1,5		

TRA I DUE INTERVENTI OCCORRE LASCIAR PASSARE 7-10 GIORNI

Propizamide svolge un'azione collaterale contro graminacee, poligonacee, Mercorella, Fumaria, Papavero, Portulaca, Erba morella, Centocchio ed altre.

SI RICORDA DI VERIFICARE SEMPRE DOSI E MODALITÁ D'USO IN ETICHETTA

COPROB
AGRICOLTURA E SOSTENIBILITÀ DAL 1962

beetnews

N. 4
2026

Notiziario di informazione per una bieticoltura sostenibile

Per le misure agroambientali attenersi ai DPI Regionali

Filamenti di cuscuta nel terreno

Filamenti di cuscuta attaccati alla bietola

Infestazione in stadio avanzato

Per ottimizzare la strategia di difesa contro la Cuscuta si consiglia di confrontarsi con il tecnico di riferimento

Si richiama la attenzione sulle **frasi** e i **simboli** di **pericolo** riportati nelle etichette dei prodotti da voi utilizzati in azienda **ricordandovi di dotarvi dei necessari dispositivi di protezione individuale** e di **attrezzature di lavoro conformi** (D. Lgs. 81/2008 e ss. mm.).

Per i principi attivi consigliati si ricorda di seguire le linee guida proposte dal proprio disciplinare regionale di riferimento in vigore.

Chi desiderasse ricevere informazioni relative alla certificazione del prodotto SQNPI, può rivolgersi all'apposito ufficio contattando i riferimenti indicati qui a fianco.

UFFICIO CERTIFICAZIONI AGRICOLE COPROB
SQNPI - Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata

Attività:
- Supporto
- Raccolta documenti
- Informazioni sul Disciplinare
- Formazione e miglioramento continuo

+39 3204456271
sqnpi@coprob.com
www.coprob.com/bietolasqnpi